Gruppe	Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Geschätzte Wahrscheinlichkeit	Geeignete Beobachtungsplätze
Enten	Krickente	Anas crecca	Hoch (70–90 %)	Flache Lagunen und Teichränder
Enten	Pfeifente	Mareca penelope	Mittel bis hoch (50–80 %)	Lagunen, Wiesen und Flachwasser
Enten	Löffelente	Spatula clypeata	Mittel bis hoch (50–80 %)	Flache Lagunen und Wasserbecken
Enten	Spießente	Anas acuta	Mittel (30–69 %)	Offene Lagunen und Flachwasser
Enten	Knäkente	Spatula querquedula	Niedrig (<30 %)	Flache Wasserbereiche
Enten	Tafelente	Aythya ferina	Mittel (30–69 %)	Tiefere Wasserflächen
Enten	Reiherente	Aythya fuligula	Mittel (30–69 %)	Tiefere Lagunen
Gänse und Schwäne	Graugans	Anser anser	Mittel bis hoch (50–80 %)	Wiesen und Lagunen
Gänse und Schwäne	Höckerschwan	Cygnus olor	Mittel (30–69 %)	Lagunen und Teiche
Reiher und Löffler	Silberreiher	Ardea alba	Mittel bis hoch (50–80 %)	Lagunenränder, Gräben, Wiesen
Reiher und Löffler	Graureiher	Ardea cinerea	Hoch (70–90 %)	Gräben, Lagunen, Feuchtwiesen
Reiher und Löffler	Löffler	Platalea leucorodia	Mittel (30–69 %)	Flache Lagunen und seichte Ufer
Watvögel	Säbelschnäbler	Recurvirostra avosetta	Mittel (30–69 %)	Lagunen und seichte Wasserbereiche
Watvögel	Austernfischer	Haematopus ostralegus	Mittel (30–69 %)	Kiesstrand und Lagunenränder
Watvögel	Großer Brachvogel	Numenius arquata	Mittel bis hoch (50–80 %)	Feuchtwiesen, Lagunenränder und umliegende Flächen
Watvögel	Kiebitz	Vanellus vanellus	Hoch (70–90 %)	Feuchtwiesen und Weiden
Watvögel	Alpenstrandläufer	Calidris alpina	Mittel (30–69 %)	Flache Ufer und schlammige Lagunenränder
Watvögel	Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	Mittel (30–69 %)	Kiesstrand, Sand und flache Ufer
Watvögel	Großer Brachvogel	Numenius arquata	Mittel bis hoch (50–80 %)	Feuchtwiesen und offene Lagunenränder
Watvögel	Bekassine	Gallinago gallinago	Mittel (30–69 %)	Feuchtwiesen, Gräben und schlammige Ufer
Watvögel	Kampfläufer	Calidris pugnax	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Flachwasser und Schlammflächen
Watvögel	Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	Niedrig (<30 %)	Kiesige Uferbereiche
Watvögel	Seeregenpfeifer	Charadrius alexandrinus	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Kiesstrand und offene Ufer
Lappentaucher	Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	Mittel (30–69 %)	Ruhige Lagunen und Gräben
Lappentaucher	Haubentaucher	Podiceps cristatus	Mittel (30–69 %)	Offene Wasserflächen
Lappentaucher	Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis	Mittel (30–69 %)	Lagunen und tieferes Wasser
Lappentaucher	Ohrentaucher	Podiceps auritus	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Offene Wasserflächen
Seetaucher	Sterntaucher	Gavia stellata	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Lagunen und Meeresbereich von geeigneten Aussichtspunkten
Seetaucher	Prachttaucher	Gavia arctica	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Lagunen und offene Wasserflächen
Seetaucher	Eistaucher	Gavia immer	Niedrig (<30 %)	Offene Wasserflächen
Meeresvögel	Basstölpel	Morus bassanus	Mittel (30–69 %)	Küstenblick und offenes Meer
Meeresenten	Trauerente	Melanitta nigra	Mittel (30–69 %)	Offenes Meer und küstennahe Wasserflächen
Meeresenten	Mittelsäger	Mergus serrator	Mittel (30–69 %)	Meer und größere Lagunen
Rallen und Sumpfvögel	Wasserralle	Rallus aquaticus	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Schilfränder, Gräben und dichte Vegetation
Rallen und Sumpfvögel	Rohrdommel	Botaurus stellaris	Niedrig (<30 %)	Schilf und dichte Ufervegetation
Rallen und Sumpfvögel	Rohrweihe	Circus aeruginosus	Mittel (30–69 %)	Über Lagunen und Schilf
Singvögel	Rohrammer	Emberiza schoeniclus	Mittel (30–69 %)	Schilfgürtel und Gräben
Singvögel	Wiesenpieper	Anthus pratensis	Mittel bis hoch (50–80 %)	Feuchtwiesen und offene Randflächen
Singvögel	Schneeammer	Plectrophenax nivalis	Niedrig (<30 %)	Kiesstrand und offene Küstenflächen
Singvögel	Ohrenlerche	Eremophila alpestris	Sehr niedrig (<10–20 %, grob)	Karge Küstenflächen und Kiesstrand
Singvögel	Wasserpieper	Anthus spinoletta	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Lagunenränder und nasse Wiesen