Gruppe	Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Geschätzte Wahrscheinlichkeit	Geeignete Beobachtungsplätze
Watvögel	Austernfischer	Haematopus ostralegus	Hoch (70–90 %)	Wattflächen, Sandbänke, flache Uferbereiche vor der Pointe
Watvögel	Großer Brachvogel	Numenius arquata	Hoch (70–90 %)	Schlickflächen und Sandbänke; auch weiter draußen mit Spektiv
Watvögel	Alpenstrandläufer	Calidris alpina	Hoch (70–90 %)	Schlickige Wattflächen und Nahrungsflächen
Watvögel	Kiebitzregenpfeifer	Pluvialis squatarola	Mittel (30–69 %)	Offene Wattflächen und Sandbänke
Watvögel	Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	Mittel (30–69 %)	Sandige Ufer und Randzonen der Wattflächen
Watvögel	Rotschenkel	Tringa totanus	Mittel (30–69 %)	Flache Wasserbereiche, Prielsäume, Schlickflächen
Watvögel	Grünschenkel	Tringa nebularia	Mittel (30–69 %)	Flache Prielläufe und Wasserflächen zwischen Sandbänken
Watvögel	Löffler	Platalea leucorodia	Mittel (30–69 %)	Flache Watt- und Randwasserbereiche; Bucht mit Spektiv absuchen
Wasservögel	Brandgans	Tadorna tadorna	Hoch (70–90 %)	Wattflächen und größere Sandbänke
Watvögel	Knutt	Calidris canutus	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Wattflächen und größere Watvogeltrupps
Watvögel	Sanderling	Calidris alba	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Sandige Ufer und Spülsaum
Watvögel	Pfuhlschnepfe	Limosa lapponica	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Wattflächen und größere Watvogelansammlungen
Watvögel	Regenbrachvogel	Numenius phaeopus	Niedrig (<30 %)	Wattflächen und Sandbänke
Watvögel	Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	Niedrig (<30 %)	Ufersäume und Randbereiche flacher Gewässer
Meeresvögel	Basstölpel	Morus bassanus	Hoch (70–90 %)	Offene Meeresfläche vor der Spitze
Meeresvögel	Brandseeschwalbe	Thalasseus sandvicensis	Mittel (30–69 %)	Über dem Meer und entlang der Bucht-Einfahrt
Meeresvögel	Sterntaucher	Gavia stellata	Mittel (30–69 %)	Offene Meeresfläche
Meeresvögel	Prachttaucher	Gavia arctica	Mittel (30–69 %)	Meer vor der Pointe
Meeresvögel	Eistaucher	Gavia immer	Niedrig (<30 %)	Offene See
Meeresvögel	Dreizehenmöwe	Rissa tridactyla	Mittel (30–69 %)	Offene See und ziehende Möwentrupps
Meeresvögel	Schmarotzerraubmöwe	Stercorarius parasiticus	Niedrig (<30 %)	Über dem Meer
Möwen	Silbermöwe	Larus argentatus	Hoch (70–90 %)	Strand, Sandbänke und Wasserflächen
Möwen	Heringsmöwe	Larus fuscus	Mittel (30–69 %)	Küste, Sandbänke und offene Wasserflächen
Möwen	Lachmöwe	Chroicocephalus ridibundus	Hoch (70–90 %)	Bucht, Strand und Wattflächen
Möwen	Sturmmöwe	Larus canus	Mittel (30–69 %)	Strand, Sandbänke und Meeresfläche
Meeresenten	Trauerente	Melanitta nigra	Mittel (30–69 %)	Offene See, Trupps auf dem Wasser
Meeresenten	Eiderente	Somateria mollissima	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Meer vor der Küste
Meeresenten	Mittelsäger	Mergus serrator	Mittel (30–69 %)	Küstennahe Wasserflächen
Meeresenten	Samtente	Melanitta fusca	Niedrig (<30 %)	Offene See
Meeresenten	Eisente	Clangula hyemalis	Niedrig (<30 %)	Weiter draußen auf dem Meer
Singvögel	Schneeammer	Plectrophenax nivalis	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Kies- und Geröllstrand, Strandwall, windgeschützte Bereiche
Singvögel	Spornammer	Calcarius lapponicus	Niedrig (<30 %)	Kiesstrand und spärlich bewachsene Flächen
Singvögel	Ohrenlerche	Eremophila alpestris	Sehr niedrig (<10–20 %, grob)	Karge offene Küstenflächen und steinige Bereiche
Singvögel	Wiesenpieper	Anthus pratensis	Hoch (70–90 %)	Grasflächen hinter dem Strandwall und Dünenrand
Singvögel	Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	Niedrig (<30 %)	Offene Küstenflächen und Kiesbereiche
Singvögel	Bergpieper	Anthus spinoletta	Niedrig bis mittel (<30–69 %)	Ufernahe offene Flächen und feuchte Randbereiche